



په افغانستان کې د ځنگلونو ایکولوژیکي او دوامداره مدیریت لپاره د سلویکلچري تگلارو او کرنو یوه روایتی

بیا کتنه

جاویدالله اقبال^{۱*}، محمد یوسف سعادت^۱

^۱ د ځنگلپوهنې او طبیعي سرچینو خانګه، کرنې پوهنځی، کابل پوهنتون، کابل افغانستان

لنډیز

ځنگل رغونه، ساتنه او بیا رغونه د بشري ټولنو د بقا، د بیولوژیکي تنوع د ساتنې، د اقلیم د تنظیم او د طبیعي ایکوسیستمونو د چوپړتیاوو د اوږدمهاله ثبات په برخه کې بنسټیز او مهم رول لري. په افغانستان کې، په ځانګړي ډول د هېواد د ختیځ او سویل ختیځ په ځنگلي سیمو کې، ځنگلونه د طبیعي منابعو یوه مهمه برخه جوړوي او د ځایي ټولنو د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري ژوند اساسي برخه ګڼل کېږي. د ځایي ټولنو د ژوند، اقتصاد او چاپیریال ترمنځ مستقیمه اړیکه شتون لري او مناسبې سلویکلچري تگلارې، دوامداره مدیریت او د ځنگلونو علمي تریبه کولای شي په دغه اړیکه مثبتې اغېزې ولري، ترڅو د چاپیریال د سمسورتیا لامل وګرځي. برعکس، د اغېزمنو سلویکلچري کرنو نشتوالی د ځنگلي پوښښ د کمښت او پر چاپیریال د منفي اغېزو سبب ګرځي. دغه مطالعه د ځنگلونو د مدیریت بېلابېلې سلویکلچري تگلارې څېړي، ترڅو له شدیدو کرنو لکه بشپړ پرېکول (Clear-cutting) که څه هم د لرګیو تولید زیاتوي ولي د ژوند بڼې زیانمنوي، اما د مناسبو تگلارې لکه انتخابي پرېکول (Selective logging)، کولای شي ایکولوژیکي ګټې وساتي. هغه ګډې او څو معیارې تگلارې چې هم تولیدي او هم ساتندویه موخو ته پام کوي، تر ټولو اغېزمن توازن رامنځته کوي. اغېزمنې سلویکلچري کرنې لکه انتخابي پرې کول، پنگي کول، بناخ پرېکونه او نور مناسبې سلویکلچري کرنې د ونو د ودې، د طبیعي بیا ټوکېدنې د پایښت او د بیولوژیکي تنوع د ساتنې لپاره مهمې دي. د ټولنې پر بنسټ مدیریت او د اقلیم بدلون ته تطبیقي سلویکلچري ستراتیژیکي ګانې د اوږدمهاله او دوامداره ځنگلي مدیریت کلیدي عناصر ګڼل کېږي. د معتبرو ژورنالونو، کتابونو او راپورونو د مطالعې او تحلیل پر بنسټ، موندنې ښيي چې متوازن، علمي او تطبیقي سلویکلچري کرنې د افغانستان د ځنگلي ایکوسیستمونو مقاومت، سالمیت او د ایکوسیستمی چوپړتیاوو د دوام وړتیا پیاوړې کوي. سربېره پردې، لا هم د اقلیم بدلون تر اغېزو لاندې د ونو د ودې ماډلونه، د افغانستان لپاره ځانګړې سلویکلچري سیستمونه، د ټولنې پر بنسټ اقتصادي ارزونې او د آفتونو او ناروغیو د اغېزمن مدیریت میتودونه لازياتو څېړنو اړتیا لري.

کلیدي کلیمات: سلویکلچري کرنې، د اقلیم بدلون سره سازښت، د ځنگل دوامداره مدیریت، طبیعي بیا ټوکېدنه، د ټولنې پر بنسټ د ځنگل مدیریت

Silvicultural Strategies and Practices for Ecological and Sustainable Forest Management in Afghanistan: A Narrative Review

Javidullah Iqbal^{1*}, Mohammad Yosuf Sadat¹,

¹Department of Forestry and Natural Resources, Agriculture Faculty, Kabul University, Afghanistan

*Corresponding Author Email: javidullah44@gmail.com

Abstract

Afforestation, forest protection, and restoration play a fundamental role in sustaining human livelihoods, conserving biodiversity, regulating climate, and ensuring the long-term stability of natural ecosystems and their services. In Afghanistan, particularly in the eastern and southeastern forested regions, forests represent key natural resources and form an integral part of local communities' economic, social, and cultural systems. A direct relationship exists between community livelihoods, the local economy, and the environment, which can be positively influenced through the application of appropriate silvicultural practices, sustainable forest management,

and proper forest tending. In contrast, the absence of effective silvicultural interventions contributes to forest cover reduction and adverse environmental impacts. This review examines a range of silvicultural management approaches, from intensive methods such as clear-cutting, which maximize timber production but result in biodiversity loss, to disturbance-based practices such as selective logging, which better retain ecological functions. Integrated and multi-criteria silvicultural approaches that balance production and conservation objectives are identified as the most effective strategies. Key practices, including selective cutting, thinning, pruning, coppicing, and retention forestry, are essential for improving tree growth, supporting natural regeneration, and maintaining biodiversity. Based on a review of scientific journal articles, books, and reports, this study highlights the importance of community-based forest management and climate-adaptive silvicultural strategies as central components of long-term sustainable management. The findings indicate that balanced, science-based, and adaptive silvicultural interventions enhance the resilience, health, and service-provision capacity of Afghanistan's forest ecosystems. However, significant research gaps remain regarding climate change-driven tree growth models, Afghanistan-specific silvicultural systems, community-based economic assessments, and effective methods for managing pests, fires, and forest diseases.

Keywords: Silvicultural practices, Climate change adaptation, Sustainable Forest Management, Natural Regeneration, Community-based Forest Management.

سريزه

ځنگلونه د ځمکې له ټولو پېچلو، متنوع او حیاتي ایکوسیستمونو څخه دي چې د اکولوژیکي، اقتصادي، ټولنيزو او فرهنگي ارزښتونو له امله د پایدار مدیریت غوښتنه کوي. د سلویکلچري تگلارو او کړنو په کارولو سره د ځنگلونو د جوړښت، ترکیب او فعالیت تنظیم د دې وړتیا لري چې د بیوډایورسټی ساتنه، ایکولوژیکي ثبات، د طبیعي پروسو دوام، او د اکوسیستم مؤثره خدمات تأمین او تضمین کړي. اوسني څېړنې ښيي چې ځنگلونه د ځمکې د بیولوژیکي تنوع له ۸۰٪ څخه زیات استازولي کوي (د ژوو، بوټو او فنجي ډولونه) او د همدې پراخې نوعي تنوع له امله، د سلویکلچري علمي تگلارې د ایکولوژیکي مدیریت لپاره بنسټیز ارزښت لري. دا تگلارې د طبیعي بیا را ټوکیدو ملاتړ کوي، د ونو د ودې دینامیک تنظیموي، د اقلیم د بدلون اغېزې کموي او د ځنگلونو مقاومت او زغم پیاوړی کوي (FAO, 2024; Aerts & Honnay, 2011).

همدارنگه ځنگلونه د پېچلو طبیعي ایکوسیستمونو په توګه په انساني ټولنو زیاتې مثبتې او منفي اغېزې لري، چې تخریب او له منځه وړل یې د انسانانو په ژوند او چاپیریال باندې نه جبرانېدونکې ناوړه اغېزې لري (دوستکامی او ملګري، ۱۳۹۲). د همدې سرچینو څخه سمه ګڼه اخیستنه د ساتنې، تربیې او بیارغونې اړوند کړنو په پام کې نیولو سره د دې سبب کېږي، چې په چاپیریال ساتنه او د هېواد د اړتیاوو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. د ځنگلي سرچینو ستر ارزښت ته په کتو سره، د دوی اندازه په نړیواله کچه ورځ تر بلې کمه شوې ده (رضایی، ۱۳۹۰).

د افغانستان طبیعي ځنگلونه د هېواد د ټول مساحت په سلو کې ۲۰.۱ برخه لري، چې د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ له ځنگلي پوښښ له پلوه تر ټولو کمترینه ساحه ده. طبیعي ځنگلونه د انرژي سرچینې، چارتراشو، غذایی موادو لکه (پسته، جلفوزي، چهارمغز، مرخپړي) او د څارویو څرخایونه دي. د دې ترڅنګ د تودوخې په نورمال ساتلو کې، د هوا پاکولو، د اوبو ککړتیاوو مخنیوی، د خاورې د تخریب مخنیوی، د بارانونو په تعادل، د قوي بادونو د زیانونو مخنیوی، د ګرځندوی صنعت، تفریح ځایونو او له خطر سره مخ حیواناتو او نباتاتو په ساتنه کې هم مهم رول لري (کوهرستاني، ۱۳۹۴). همدارنگه د جلفوزیو ځنگلونه هم د سون لپاره (لرګي او خالي غوزې)، طبي نباتات، د حیواناتو له پاره څرخای او سرپناه، د وحشي حیواناتو هستوګنیز ځای او نور چاپیریالیز خدمتونه ترسره کوي (S. Khurram and Shalizi, 2016).

د اقلیم بدلون، د نفوس زیاتوالی، د طبیعي منابعو فشار، او د ټولنيزو اقتصادي اړتیاوو بدلونونه د دې لامل شوي چې د ځنگلونو دودیز مدیریت نور د اوسني زمانې اړتیاوې نه شي پوره کولی. همدا لامل دی چې د تطبیقي (Adaptive) ځنگل مدیریت مفهوم د معاصر سلویکلچر په مهم بحث بدل شوی دی (D'Amato & Palik, 2021). تطبیقي مدیریت د داسې ماډلونو رامنځته کول موخه ګرځوي، چې د چاپیریالیزو نامعلومو شرایطو، اقلیمي ګډوډیو او د ایکوسیستم د احتمالي خطرونو په وړاندې د ځنگلونو مقاومت او زغم (resilience & resistance) لوړ کړي، او د هغوی د ایکوسیستم حیاتي خدمات خوندي وساتي (Yousefpour et al., 2011).

په تېرو څو لسیزو کې د بېلابېلو اقتصادي، سیاسي، کلتوري او ټولنيزو لاملونو پر بنسټ هر کال د بېلا بېلو عواملو لکه د سون توکو، د فرنیچر او ساختماني صنایعو، د کرنیزو ځمکو پراختیا، د لرګیو قاچاق او طبیعي پېښو، لکه: وچکالي، سختو سیلابونو، اورونو او نورو د ځنگلونو په

ويجاړولو کې لوی رول لوبولی دی، که تخریب يې په همدې ډول دوام ومومي، په نږدې راتلونکي کې به نه جبرانېدونکو چاپېريالي ننگونو سره مخ شو (امين، ۱۳۹۵). د ځنگلونو د پايداره او ايکولوژيکي مديريت لپاره د سلويکلچري کړنو او تگلارو دغه شاليد تيرو څېړنو ته په کتنې څخه په گټې اخيستې سره د معلوماتو يوه ټولگه ده. د دغه شاليد موخه په افغانستان کې د ځنگلونو د ايکولوژيکي او دوامداره مديريت لپاره سلويکلچري کړنو او تگلارو روښانه کول او ټاکل دي.

کړنلاره

دا مروري مقاله د روايتي بياکتنې (Narrative Review) په چوکاټ کې ترسره شوې ده، چې موخه يې په افغانستان کې د ځنگلونو د ايکولوژيکي او دوامدار مديريت لپاره د سلويکلچري تگلارو او کړنو موجوده علمي شواهد، تجربې او څېړنيزو تشو روښانه کول دي. د علمي شواهدو او معلوماتو راټولولو د لټون ستراتيژي لپاره اکثر د ۲۰۱۵-۲۰۲۴ کلونو پورې د خپاره شوي ملي او نړيوالي څېړنې، راپورونه، علمي څېړنيز کتابونه کارول شوي دي. د مقالو سيستماتيک لټون لپاره Google Scholar، ResearchGate، FAO Reports، IPCC، Assessment Reports، د افغانستان د کرنې وزارت، چاپېريال ساتنې ملي ادارې او نړيوالو سازمانونو (NGOs) راپورونو ډيجيټلي علمي سرچينو څخه گټه پورته شوي ده.

موندنې

د ځنگلونو اهميت ته په کتو د افغانستان د ځنگلونو ايکولوژيکي او فشار لاندې اوسنی وضعيت

ځنگلونه په هايډرولوژيک دوران کې مهم رول لري، د اورښت په اندازه، کيفيت او وېش باندې اغېز کوي (Miura et al., 2015; FAO, 2013). د ونو پانې لرونکې چترې د باران د نيولو له لارې د سطحې د ککړتيا او خاورې د تخریب مخه نيسي او د ريښو د سيستمونو په وسيله د خاورې نفوذ، ثبات او د ښويښې/ښکته توبدنې مخنيوی کوي (Altieri et al., 2018; Zore et al., 2022; Buckley et al., 2018; Sidle & Ziegler, 2017). په هېواد کې د څو لسيزو راهيسې د اورښتونو کموالی او نامنظم والی هغه منفي پدیده ده، چې د هېواد په ټولو اوبيزو حوزو کې يې گڼ شمېر ناوړه طبيعي پېښې رامنځته کړې دي، لکه د خاورې د پاسنې طبقې تخریب، د ځنگلونو او نباتي پوښښ له منځه تگ، د وچو سيمو پراخېدل، د ځمکو دښتې کېدل او لسگونه نورې چاپېريالي ستونزې. د دغو بدلونونو له امله د ټولو ژونديو موجوداتو ژوند په مستقيم او غير مستقيم ډول اغېزمن شوی دی. له بده مرغه، دا ټول حالتونه د نړيوالو اقليمي بدلونونو يوه کوچنۍ پایله بلل کېږي. که چېرې په ملي او نړيواله کچه د اقليمي بدلونونو پر وړاندې هر اړخيزې څېړنې ترسره نه شي، نو ډېر ژر به د ژونديو موجوداتو استوگنيز چاپېريال له گټو جدي ستونزو سره مخ شي. (رشتين او صافي، ۱۴۰۳).

ځنگلونه د نړيوال کاربن په دوراني سيستم کې ستر اهميت لري او د اقليم د تنظيم لپاره د شنو خونو گازونو د جذب کليدي سرچيني دي (Dye et al., 2024; FAO, 2023). د فوتوسنتيز له لارې د CO₂ جذب، د اکسيجن ازادول او کاربن په ونو او خاوره کې زېرمه کول د دوی مهمه دنده ده (Walker et al., 2020; Fatichi et al., 2014; Malhi et al., 2002). وروستۍ څېړنې څرگندوي چې ځنگلونه په نړۍ کې خالص کاربن سنک گڼل کېږي (Grassi et al., 2017; Harris et al., 2021).

جوته شوه چې د افغانستان ځنگلونه د جدي گواښ سره مخ دي او د پام وړ ايکولوژيکي او اقتصادي اغيزو لاندې دي، چې د چټک تخریب او د ايکوسيستم د خدماتو د ارزښت د پام وړ کمښت سره مخ دي. همدارنگه څېړنو وښوده، چې د هېواد ځنگلونه د بېلابېلو فشارونو لاندې دي. لکه؛ د نفوس زياتوالی، غيرقانوني پرې کول، د سون لرگيو استعمال، اورونه او جگړې چې د ونو د جوړښت، ترکيب او تنوع شمير ته يې زيان رسولي دي. د خپرل شويو ادبياتو په بنسټ د ايکولوژيکي پلوه د ځمکې پوښښ لکه ځنگلونه د تيرو دوو لسيزو په اوږدو کې خورا بې ثباته او په چټکۍ سره د ساحې له پلوه کم شوي دي. د ايکوسيستم د خدماتو ټول ارزښت د ۲۰۰۰ کال د ۱۶۱ ميليارډ ډالرو څخه تر ۲۰۲۰ کال پورې ۱۵۲.۲۷ ميليارډ ډالرو ته راکښته شوې، چې د دې کمښت شاوخوا ۹۲٪ يې د ملاتړ او چمتو کولو خدماتو اغيزمن کړي (Najmuddin et al., 2022). د ځنگلونو ايکوسيستمونه د ډيرو فشارونو لکه د کرنې پراختيا، ښاري پراختيا، او د ځمکې د کارونې بدلونونو سره مخ دي (D. Bazarov et al., 2023). همدارنگه د څلورو لسيزو د نا امنیو له امله د کابل د حوزې د اوبو سرچينې د قوانينو نه مراعات کولو او يا مديريت پرته کارول شوي، چې د ځمکې د تخریب او د اوبو د سرچينو د تخریب لامل شوي. په لنډ ډول د دوامداره پراختيا د ترلاسه کولو لپاره د طبيعي سرچينو هر اړخيز مديريت ته اړتيا ده (گلاب شاه امانی او ملگري، ۲۰۲۵).

د سلویکلچري تگلارو اغېزمنتیا:

د لټول شویو ادبیاتو پر بنسټ، سلویکلچري طریقې لکه؛ thinning، pruning، انتخابي پرېکول (selective logging)، او retention forestry د ځنګل جوړښت ښه کوي، طبیعي نوی کیدو ته زمینه برابروي، او د تنوع ساتنه پیاوړې کوي (Gustafsson et al., 2012; Lindenmayer et al., 2012).

طبیعي بیا ټوکیدني (Natural Regeneration) دوامداره بیارغونې لارې:

د افغانستان په ځنګلې سیمو او په ځانګړي ډول په غرنیو ځنګلونو کې، طبیعي بیا ټوکیدني (ANR (Assisted Natural Regeneration) او د مورنیو ونو ساتنې تگلارې کارول ګټور تمام شوي دي، ځکه لګښت یې نسبتاً ټیټ دی، او د سیمې د اقلیم سره ښه تطابق لري (Shalizi et al., 2018; Khurram et al., 2023).

ټولني پر بنسټ مدیریت (Community-based Management):

څېړنې ښيي چې په هغو سیمو کې، چې د ځنګل مدیریت د محلي ټولنو په مشارکت سره ترسره کېږي، د غیرقانوني پرې کولو کچه راټیټه شوې ده. بیا هم د قانون او پالیسي کمزوري، د اقتصادي بدیلونو نشتون، او دولتي همکارۍ کمښت د دې میتود تطبیق محدوده وي (Khurram et al., 2024; Pujon et al., 2018).

د اقلیم بدلون ته حساسیت:

د ځنګلونو په وضعیت کې د اقلیم بدلون یوه مهمه ننگونه ده؛ زیاتې تودوخې، غیر منظم بارانونه او وچکالی د ونو په وده او بقا منفي اغېز لري (IPCC, 2023). د ځانګړو ډولونو ونې، لکه جلعوزي (Chilgoza Pine)، د اور، آفتونو او اقلیمي بدلون پر وړاندې ډېر زیان منونکي دي.

تخنیکي او انساني ظرفیت کمزوري:

شواهد ښيي چې په افغانستان کې سلویکلچري علمي پوهه، مسلکي کادرونه، او تطبیقي څېړنیز ظرفیت محدود دی. د متخصصینو کمښت، مالي محدودیتونه، او د ساینسي مدیریت تگلارو نه پلي کېدل د سلویکلچري کړنو د پیاوړتیا خنډ دي (Khurram & Shalizi, 2016; Khurram et al., 2023).

د تطبیقي (Adaptive) سلویکلچر اړتیا:

څېړنې وړاندیز کوي چې د اقلیم بدلون، اقتصادي فشارونو او ټولنیزو بدلونونو په رڼا کې باید د مدیریت ماډلونه تطبیق (adaptive) شي. د دې تگلارې پلي کول، لکه د عمر متفاوت جوړښت، د څو نوعو ونو ګډ کښت کولی شي د ځنګل مقاومت او زغم زیات کړي (D'Amato & Palik, 2021; Yousefpour et al., 2012).

د بیا کتنې موخه او د څېړنې پوښتنې

د دې بیا کتنې موخه د کرنې څېړنیز مرکزونه، په ځانګړي ډول ځنګلونو ساتنې او مدیریت اړونده ادارې، د چاپیریال ساتنې ادارې او نورې اړوند ادارې هڅوي، چې د ځنګلونو د مدیریت لپاره سلویکلچري تگلارې او کړنې (لکه د نیالګیو د کرلو کمپاینونه، د ځنګل پریکونه (قطع)، ښاخ غوڅونه، thinning طریقي، د ځنګل رغونه، تربیه او نور میتودونه) په لاره واچول شي، چې د ځنګلونو مدیریت او د پایداره ګټه اخیستنې له پاره مناسب شرایط برابر شي. تر کومه ځایه، چې پوهېږو په ځنګل کې د سلویکلچري عملیاتو ترسراوی، د ځنګلونو د پایداره مدیریت او د ګټه اخیستنې مناسبې تگلارې د ځنګل په وده او تکامل باندې ډیرې مثبتې اغیزې لري، تر څنګ یې د نورو څېړونکو له پاره په افغانستان کې د ځنګلونو د پایداره مدیریت مطالعاتو له پاره یو مهم اساس منځ ته راوړي، چې په پای کې دغه مقاله د افغانستان د ځنګلونو ایکولوژیکي او دوامداره مدیریت لپاره د نورو مختلفو اغیزمنو سلویکلچري تگلارو او کړنو وړاندوینه کوي.

د ټوک وهل (Coppice) مدیریت د نه ترسراوې اغېزې د ځنګل په ایکوسیستم

ټوک وهل (Coppicing) د ځنګل د مدیریت یو پخوانی دودیز سیستم دی چې په کې ونې په منظم ډول پرې کېږي، ترڅو له هغو څخه د نویو ښاخونو وده وهڅول شي. دا نوي ښاخونه چې coppice shoots یا sprouts بلل کېږي، عموماً د ۱۰ نه تر ۴۰ کلونو وروسته (د ونې د نوعې او د لرګي د استفادې موخې پورې تړلي) بیا پرې کېږي، او په دې توګه د لرګیو د تولید یو تکراري او دوامدار سیستم رامنځته کېږي. دا

طریقه د هغو پراخو پایو لرونکو ونو د طبیعي وړتیا څخه استفاده کوي چې له پرې کېدو وروسته بیا ژوندي ښاخونه ټوکوي (Matula et al., 1987; Koop, 2012). دا د طبیعت هغه غبرگون دی چې د بادونو، اورلگېدنو، وابنو خوړونکو حیواناتو، وچکالی، سېلابونو، آفتونو او ناروغیو له امله له منځه تللي ښاخونه او تنه بیرته راټوکېږي (Bond and Midgley, 2001). نوي ښاخونه یا خو د رېښې د غاړې غدو (buds) له فعالېدو څخه، یا د ټپ وروسته په نموی نسجونه (کالوس) کې د نويو غدو له جوړېدو څخه، او یا هم د رېښو له خوا د suckers په بڼه ټوکېږي (Buckley and Mills, 2015). دا وړتیا د ونې له عمر، د تنې قطر او د پاتې شویو ونو له کټوالي سره تړاو لري (Vacchiano et al., 2017).

د تخم له لارې رامنځته شويو ځنګلونو (High forests) په پرتله، په ټوک وهلو کې د پرې کولو دوره ډېره لنډه وي. سربېره پردې، د ټوک وهلو له لارې بېرته رغېدل ډاډمن، نسبتاً آسانه، او د هغو ژوندو رېښو د غذايي ذخایرو له امله تر نیالګیو ډېر چټک وده کوي (Zhu et al., 2012). د همدې دلیل لپاره، د کرنې د پیل دورې څخه تر ۱۹مې پېړۍ پورې، په اروپا کې د ځنګل مدیریت تر ټولو ډېر کارېدونکی سیستم همدا ټوک وهل وو (Buckley and Mills, 2015; Szabó, 2009).

ایکولوژیکي او ټولنیز اړخونه

نن ورځ د اقلیم بدلون (CC) او د ځمکو د کارونې بدلون (LUC) د ځنګلونو په جوړښت، دندو او ان د انسان پر ژوند مستقیم او غیرمستقیم اغېز درلودلی دی (IPCC, 2023). څرنګه چې ځنګلي ونې او په ځانګړې توګه د جلفوزي ځنګل یو له مهمو غیر لرګینو محصولاتو څخه دی، سیمه ایزو خلک (هغه چې له ځنګلونو سره نږدې ژوند یی ور پورې تړلی دی، نو له همدې کبله د طبیعي سرچینو د تنظیم د ټولنیز اصل (Community based natural resource management) په نظر کې نیولو سره ورڅخه د صحیح او پایداره ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابره او یو منظم پلان ورته جوړ شي (Khurram et al, 2024).

د دریمې نړۍ هیوادونو د ځنګلونو د پایښت او دوامداره مدیریت لپاره هغه اړینې سلویکلچري تګلارې چې د ځنګلونو په ایکولوژیکي مدیریت کې رغنده رول لري شتون نه لري، له همدې کبله اړینه ده چې په داسې هیوادونو کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره تګلارې او کرنې په کار واچول شي. د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې دوامداره مدیریت او سلویکلچري کړنو نه ترسره کول د ځنګلونو د تخریب او له منځه تللو سبب وګرځي او لیري به نه وي چې ځنګلي پوښش به په چټکۍ سره کم او له منځه ولاړ شي.

د بېلګې په توګه د جنوبي ایتوپیا په جیمه سیمه کې د ځنګلونو د تخریب او چاپیریال مدیریتي کړنو او پالیسیو اړوند څېړنو پایلو ښودلې ده، چې د ځنګلونو د ادارې کمزوري او چاپیریالي قوانینو نه شتون له امله د سیمې ځنګلونه ډېر زیانمن شوي دي؛ نو له همدې امله باید د زیاتې ګټې اخیستنې د زیانونو اړوند د ځنګلونو د پایښت لپاره دوامدارې هڅې ترسره شي، څو د ځنګلونو په برخه کې یو مثبت بدلون راوستل شي (Nura & Endris, 2020). بله بېلګه په افغانستان کې له خطر سره مخ انواعو ځنګلونو وضعیت او د دوامداره مدیریت په هکله د څېړنې پایله ښيي، چې په هېواد کې د جلفوزیو ځنګلونو د تخریب بېلابېل حالاتونه لري، د افغانستان له ځنګلي سیمې په اوږدو کې د جلفوزیو ځنګلونو بیا رغېدنه ډېره کمزوري وه؛ نو د دې له پاره باید د ځانګړې وضعیت پالیسی او کړنو سره د ځانګړو ټولنیزو-ایکولوژیکي شرایطو سره سم په لاره واچول شي (Shalizi et al., 2018). د دې تر څنګ د پستې ځنګلونو د مدیریت په هکله د کلیوالي ټولنو نظریاتو او ځنګلونو ځانګړنو په هکله د څېړنې پایلو ښودلې، چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه ځنګلونه د دوی د کورنیو له پاره د ژوندانه د بېلابېلو لارو ملاتړ کوي. سره له دې که څه هم خلک د خپلو اغېزو په اړه، چې د پستي راټولولو، څارویو څر، سون لرګیو ټولولو له لارې په ځنګل عامه پوهاوی لري او روزل شوي، خو بیا هم ځنګلونه کمزوري او کمه بیا رغونه لري. د دوامداره مدیریت له پاره باید د ځنګلونو فزیکي حالت، د ټولنو د ګټه اخیستنې دودیز پوهاوی او له ځنګلي سرچینو د کارونې له پاره شته او وړاندیز شوي مدیریتي تدابیر، د هرې سیمې له ځانګړو شرایطو سره سم وپېژندل شي (Mahmoodi et al., 2023). همدا راز د نایجیریا په کراس ریور ایالت کې له ځنګلي منابعو دوامدارې ګټې اخیستنې، د چاپیریال ساتنې د پوهاوی ستراتیژي او ټولنیزو رسنیو ارزونې، څېړنې پایلې ښيي، چې د کلیوالو خلکو ترمنځ د چاپیریال ساتنې پوهاوی او د ځنګل منابعو د دوامداره ګټې اخیستنې له پاره، د ټولنیزو رسنیو له لارې معلوماتي کمپاینونه ډېر اغېزناک تمام شوي دي. دې څېړنې وښوده، چې د چاپیریال ساتنې پیغامونه که د محلي ژبو، دودیزو ارزښتونو او ساده ابلاغ له لارې وړاندې شي. نو دا کولای شي، چې د خلکو سلوک له ځنګلونو سره د چلند په برخه کې مثبت بدلون ورکړي (Egboniyi et al., 2019). د ټولنیزې ځنګلدارۍ د پرمختګ له پاره یوې څېړنې ښودلې، چې د ځنګلدارۍ مدیریت له پاره د عامه پوهاوی او پالیسي اوس هم ستونزې لري او دا

هغه وخت ښه والي کوي، چې خلکو ته عامه پوهاوی د ټولني په بنسټ ځنگلونو مدیریت له لارې ترسره شي. د عامه پوهاوی پراخولو له پاره دا اړینه ده، چې د ځنگلدارۍ په پروگرامونو کې د ټولني د ظرفیت لوړولو بنسټیز مفهوم درک شي. او له ځنگلونو څخه د پایداره گټه اخیستنې تر څنګ خلکو ژوند ښه شي (Pujo et al. 2018). د مختلفو نظرونو څخه معلومېږي، چې د ځنگلونو د پایداره مدیریت، سلویکلچري کړنو او تگلارو نه شتون د ځنگلونو د ساتنې او بیارغونې په برخه او چارو کې ستونزې منځته راوړي. د اقلیم سره تطابق لرونکي ځنګل پالنه کولی شي د دودیزو کړنو په پرتله هم په تولید او هم په متنوع شتمنیو کې غوره نتایج ورکړي په ځانګړې توګه د لوړ کارین ډای اکساید شرایطو کې، او د بدلونونو سره د تطابق لپاره زیات انعطاف لري (Gustafson et al. 2020). همدارنګه د هر عمر لرونکي او پرله پسې پوښنې ځنګل پالنه د ۱۰۰ کلونو په موده کې د کارین جذب او تنوع شتمنی غوره پایلې وړاندې کوي، پرته له دې چې اقتصادي زیان رامنځته کړي (Díaz-Yáñez et al., 2019). د وخت فکتورونه لکه د دوران اوږدوالی، د بیا رغونې موده، او د مداخلې وخت، د اوږدمهاله پایښت لپاره خورا مهم دي. مطالعات د دوران اوږدولو، د څو مدیریتي کړنلارو یوځای کول، او د ځنگلونو د لیدلوري په کچه پلان جوړونې سپارښتنه کوي، ترڅو ځنگلونه د راتلونکي اقلیمي او اقتصادي ناڅرګندو حالاتو په وړاندې خوندي او پایدار وساتل شي (Ameray et al., 2021; Decocq et al., 2004; Gustafson et al., 2020).

تطیقي سلویکلچري تگلارې:

د تطیقي (Adaptive) ځنګل مدیریت اړتیا

اوسنی حالت تقاضا کوي چې د ځنگلونو د مدیریت ماډلونه د اقلیم، اقتصاد او ټولني له نویو ستونزو سره سم عیار شي (D'Amato & Palik, 2021).

د تطیقي ځنګل مدیریت (AFM) موخي:

- د ځنگلونو د ایکوسیستم خدمات توازن وساتل شي،
- مقاومت (Resistance) او زغم (Resilience) لوړ شي،
- د نامعلومو شرایطو لپاره مناسب جوړښت رامنځته شي (Yousefpour et al., 2011).

د تطیقي مدیریت لارې:

- ۱- د ځنګل موجوده جوړښت ساتل؛
 ۲. Passive adaptation یا دانسان له فعالې مداخلې پرته پرېښودل کېږي څو خپل طبیعي بهیرونه پخپله تنظیم او د چاپېریالي بدلونونو سره تطابق وکړي (Rewilding)؛
 ۳. Active adaptation یا د ونو جوړښت او ترکیب بدلول، لکه:
 - ❖ له یوه نوعي ځنګل څخه څونوعي ځنګل ته بدلون؛
 - ❖ له یو عمر لرونکي ځنګلي جوړښت څخه ناهم عمر جوړښت ته بدلون؛
 - ❖ د کاپي سی څخه لوړ وده لرونکي ځنګل ته بدلون؛
- دا بدلونونه د اور، باد، افتونو او د خاورې د خطرونو پر وړاندې مقاومت زیاتوي (Hessburg et al., 2021).
- د پایداره گټې اخیستنې د پلان عملي کولو اوږد مهاله گټې به دا وې چې دواړه (ځنګل څخه گټه اخیستونکي ټولني او ځنگلونه) ته به هم مهاله گټه رسېږي (خرم، ۲۰۲۴). د پایداره گټې اخیستنې په پلان کې له بیلابیلو کړنلارو یا سټراتیژیو څخه گټه اخیستل کېدای شي، ترڅو دواړه موخي، له ځنګل څخه په لاس راغلې مالي گټه (د غوزو له پلورولو څخه په لاس راغلی عاید) او طبیعي بیارغیدنه (د ځنګل ښه وضعیت) پکې په هم مهاله توګه ترلاسه شي (Khurram et al., 2023).

مناقشه

د ځنگلونو د دوامداره او ایکولوژیکي مدیریت د مختلفو سلویکلچري تگلارو او کړنو پر بنسټ ولاړ دی، چې موخه یې د چاپېریال ساتنه او د ځنګلي سرچینو سم استعمال او د دواړو برابرښت دی. دغه تگلارې بیلابیلې لارې چارې لري چې د ځنګل مقاومت لوړوي، د نوعو تنوع

ساتي، او د ځنگلي محصولاتو د دوامداره برابرښت ډاډ ورکوي. وروستيو څېړنو کې وموندل شوه چې، ټوليز اقتصادي بدلونونه، لکه ښاري کېدل، د کليوالي اقتصاد څخه صنعتي اقتصاد ته تګ، د بازار غوښتنې او پالیسي بدلون د ځنگل مدیریت پرېښودو لامل ګرځېدلی دی (Leite, 2025; Schirpke et al., 2023). پایله ترلاسه کېږي، چې په افغانستان کې د ځنگلونو د بې ثباتۍ او ناسم مدیریت علت د تیرو کلونو نا امنې او جګړه بلل شویده، چې په ورته ډول په یوه څېړنه کې ښودلې شویده چې، جګړې د ځنگلونو په برخه کې د خنډ په توګه د ځنگلونو جوړښت او ډینامیک اغېزمن کوي او د لرګیو بازارونه ګډوډوي (Prins, 2022; Formoli, 2009). همدارنګه په افغانستان کې د سلویکلچري تګلارو او کړنو په اساس د ځنگلونو مدیریت نه تر سره کول د ځنگلونو د منځه تګ او کموالی سبب شوی دی چې په ورته ډول په اروپا کې د کاپي سی (Coppice) پخواني مدیریتي تګلارې څخه لاس اخیستل د ځنگلونو په جوړښت، بیولوژیکي تنوع، کاربن ذخیره، او د طبیعي پېښو په وړاندې په مقاومت او زغم منفي اغېز کوي (Kamp, 2022; McGrath et al., 2015). خو د ځنگلونو دغنغوي طریقو پرېښودل مثبت او منفي دواړه اړخونه لري (Garbarino et al., 2020). د څېړنو د پرتلې څخه په ډاګه شوه، چې د هیواد ځنگلونه لا اوس هم په دودیز ډول مدیریت کېږي چې دې ډول مدیریت د افغانستان ځنگلونه اغېزمن کوي دي او په ساتنه کې د نویو تګلارو او طریقو کار نه اخیستل کېږي. په ځینو کم نفوسه سیمو کې دا عمل د Rewilding لپاره مناسبه لار ګڼل کېږي، خو په ډېرو ځایونو کې د پخوانیو مدیریتي کړنو پرېښودل د نیالګیو ضعیف کېدل، د استوګنځای له لاسه ورکول، د اورخطر زیاتوالی، او د کلتوري منظرو ویجاړتیا رامنځته کوي (Santoro & Piras, 2023). د بېلګې په ډول د اروپایي "خوږ چینار" (Sweet Chestnut) کاپي سی ځنگلونو پرېښودل یوه څرګنده بېلګه ده چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په چټکۍ سره کم شوي (Vecchio et al., 2025). د مدیریت نشتوالی د ونو ګډ جوړښت بې ثباتي، د رڼا کمښت، د نوعو ترکیب بدلول، او د اور، افتونو او ناروغیو خطر زیاتوي (Garfi et al., 2022).

څېړنې ښيي چې شدیدې ځنگل مدیریت (Intensive forest management)، لکه د ځنگل جوړونې (Afforestation)، سرې ورکول (Fertilization)، او بشپړ پرېکول (Clear-cutting) د لرګیو لوړ حاصل او اقتصادي ګټورتیا سره تړاو لري (Díaz-Ameray et al., 2021). 2019؛ Yáñez et al., 2020؛ Knoke et al., 2020). د بېلګې په توګه، Ameray او همکاران 2021 راپور ورکوي، چې د ډګلس فر (Douglas-fir) د حاصل اندازه د جنیټیکي ښه والي او سرې ورکولو له امله له 174 m³/ha څخه 643 m³/ha ته لوړه شوې ده.

همدارنګه Díaz-Yáñez او همکاران 2019 څرګندوي، چې د ونو د ودې د پړاو مدیریت تګلارې هغه کړنې دي چې د پاسه نری کولو (Thinning from above) یا د ونو د پړاو او دوامداره پوښښ ګډې لارې په کارولو سره، د ځنگل کیفیت، تولیدي ظرفیت او اکولوژیکي ثبات ساتي. دغه تګلارې د ونو د ودې په مختلفو مرحلو کې پلان شوي اقدامات په ګوته کوي ترڅو د اقلیمي بدلونونو، ناروغیو، اور او نورو احتمالي خطرونو په وړاندې د ځنگل مقاومت او دوام تضمینوي، هم اقتصاد ته ګټورې دي؛ او هم د دودیزو سیستمونو په پرتله زیات ایکوسیستم خدمتونه وړاندې کوي.

په یوه بله ورته څېړنه کې Knoke او همکاران 2020 موندلې چې هغه تګلارې چې د اقتصادي عاید زیاتوالي ته لومړیتوب ورکوي؛ لکه بشپړ پرېکول؛ تر هغو تګلارو پورې چې د څو معیارونو پر بنسټ سمون کوي، تر 47% پورې لږ کاربن زېرمه کوي، خو د خاورې د طمعې ارزښت (Soil Expectation Value) یې تر 39% پورې لوړ وي. د شرایطو پر بنسټ سمون برخه کې څو څېړنې ټینګار کوي چې د پلي کولو کیفیت، د ساحې شرایط، او د بازار عوامل د اقتصادي پایلو په لاسه کولو کې مهم رول لري. شدیدې ځنگل مدیریت د لوړ تولیدي ساحو لپاره تر ټولو مناسب دی، خو ګډې یا متنوع تګلارې (لکه TRIAD تګلاره یا Retention forestry) د ځانګړې مقاومت او انعطاف وړتیا برابروي؛ (Díaz-Yáñez et al., 2019; Ameray et al., 2021; Gustafson et al., 2020). هغه تګلارې چې د طبیعي ګډوډۍ سیستمونه تقلیدوي؛ لکه انتخابي پرېکول Selective logging، د ساتنې ځنگل پالنه Retention forestry، او دوامداره پوښښ (Continuous cover forestry)، د نوعو د زیات تنوع او د فعاله ډلو (Functional diversity) د ساتنې سره تړاو لري (Decocq et al., 2004; Latterini et al., 1998; Miller and Kochenderfer, 2023). څرګندوي چې انتخابي پرېکول او د ساتنې ځنگل پالنه په استوایي ځنگلونو کې د ونو پر بیولوژیکي تنوع محدود منفي اغېز لري، خو نری کول (Thinning) او "Coppicing" هغه وخت ګټور تمامېږي، چې د شدت او دورې موده په دقت سره اداره شي. د لوړ شدت مداخلې په برخه کې منفي اغېزو ښودلې ده چې د مکررې یا شدیدې مداخلې، لکه د لنډ دوران انتخابي پرېکول یا درنې سرې ورکول؛ د حساسو نوعو او فعاله ډلو (Functional guilds) شمېره کموي. Decocq او همکاران 2004. راپور ورکوي چې د Coppice-with-standards سیستمونه د نوعو او دندیزې تنوع (Functional diversity) لوړه کچه ساتي، په داسې حال کې چې انتخابي پرېکول د لومړنیو پړاونو (Early successional) نوعو د واکمنېدو او د "ریښتینو ځنگلونو"

د ډلو د له منځه تلو لامل گرځي. د ځنگل د جوړښتي پېچلتيا او بيا رغونې په برخه کې، هغه کړنې چې جوړښتي پېچلتيا رامنځته کوي؛ لکه د گروبي ټاکنې عمليات او د شکل مخي پرانستې، او د بيا رغونې لپاره د دوران موده اوږده وي، د لوړ وده لرونکي ځنگل ساتنې شتمني ته وده ورکوي (Decocq et al., 2004; Latterini et al., 2023; Miller and Kochenderfer., 1998). د مطابقت لرونکې مدیریت مطالعه شواهد ښيي چې د تنوعي شتمني ساتنه تر ټولو ښه د متنوع، مطابقت لرونکې مدیریت له لارې ترلاسه کيږي، چې په کې د زیاتې گډوډۍ مخنیوی او د هستوگنځایونو توپیر ساتل شامل دي.

د اقلیم سره د تطابق او اوږدمهاله پایښت د تنوع او تطابق له لارې مقاومت د ماډل کولو مطالعې (Gustafson et al., 2020; Knoke et al., 2019) ښيي؛ چې هغه ستراتیژي چې تنوع، ساتنه، او مطابقت لرونکي مدیریت په پام کې نیسي، د اقلیم بدلونونو په وړاندې ډیر مقاومت لرونکي دي او اوږدمهاله د تولید او اکوسیستم خدماتو ساتنه یا وده کوي.

د ځنگل د مدیریت سلویکلچري تگلارې له هغو شدیدو (Intensive) طریقو څخه، لکه روښانه پرېکول (clear-cutting) چې د لرگیو حاصل زیاتوي خو د ژوندي موجوداتو تنوع کموي، تر هغو طبیعي گډوډۍ تقلیدوونکو (Natural disturbance) طریقو پورې، لکه انتخابي پرېکول (selective logging) چې طبیعي گټې او تنوع ساتي، توپیر لري. د یو ځای څو اړخیزو تگلارو پلي کول، چې اقتصادي، ایکولوژیکي او اقلیمي موخې سره یو ځای کوي، تر ټولو متوازن پایلې وړاندې کوي. لاندې برخې د دې تگلارو مهمې ځانگړتیاوې بیانوي.

پراخ مدیریت: د پایښت لرونکي ځنگل ساتنه د اکولوژیکي، ټولنیزو، او اقتصادي ارزښتونو گډوډي، په دې توگه ډاډ ترلاسه کوي چې د ځنگل سرچینې د اوسنې او راتلونکي اړتیاو پوره کولو لپاره مناسبې دي (Boyle et al., 2016). اقتصادي او ټولنیز اړخ ته په کتو، شاوخوا ۱.۶ میلیارده خلک د ژوند د اړتیاوو لپاره په مستقیم ډول د ځنگلونو پر سرچینو متکي دي (FAO, 2023). په تاریخي لحاظ د ځنگلونو غالب رول د ټولنیزو اړتیاوو له مخې وخت په وخت بدل شوی (Miura et al., 2015; Parrotta et al., 2015).

ایکو سیستم خدمات: د مدیریت کړنې د ایکو سیستم خدماتو ساتلو باندې تمرکز کوي، لکه د کاربن ذخیره، د اوبو تنظیم، او د بیولوژیکي تنوع ساتنه (藤森, 2000).

د ځنگل ساتنې تخنیکونه

د ایکولوژیکي بیا رغونې مدیریت: تخنیکونه لکه مدیریت شوی بیا رغونه د مختلفو ډولونو تر منځ رقابت مدیریت کوي، او د ونو ودې کیفیت ښه کوي (藤森, 2000).

د تطبیقي ځنگل ساتنه: دا د تطبیقي مدیریت د کړنو اهمیت څرگندوي، چې د ایکولوژیکي بدلونونو او گډوډیو په وړاندې د ځنگل مقاومت د لوړولو لپاره اړین دي (Pulido, 2013).

بیولوژیکي تنوع او د ایکو سیستم روغتیا

د ساتنې ستراتیژي: هغه کړنې چې د بیولوژیکي تنوع ساتلو او د خاورې او اوبو سرچینو ساتلو هدف لري، د پایښت لرونکې مدیریت لپاره مهمې دي (藤森, 2000). پداسې حال کې چې دا ستراتیژي د پایښت لرونکې ځنگل مدیریت لپاره ضروري دي، لاهم ستونزې شتون لري، په ځانگړي ډول د لرگیو تولید او ایکولوژیکي بشپړتیا ترمنځ توازن ساتلو کې د ځنگل ایکو سیستمونو د اوږد مهال پایښت ترلاسه کولو لپاره د دوامداره څیړنې او محلي شرایطو د تطبیق اړتیا خورا مهمه ده.

د افغانستان د وضعیت له مخې د سلویکلچري تگلارو د پیاوړتیا اړتیا

د جوړښتي ساتنې او منغیرې ساتنې پرېکولو (Variable-retention harvesting) تگلاره: دا چې د ونو پرېکولو یا د طبیعي گډوډۍ وروسته د مداخلې پر مهال، ژوندي تخم لرونکي ونې، زړې (وتلې) ونې، سوري لرونکې ونې او د وچو ونو پاتې شوني (CWD) ساتل کېږي. دا کار د ژوو د استوگن ځایونو دوامدار شبکه خوندي کوي، د تخم د سرچینو ساتنه کوي، او داسې کوچني اقلیمي پناه ځایونه رامنځته کوي چې طبیعي بیا وده چټکه کوي او د ایکوسیستم د فعالیتونو دوام تضمینوي (Iqbal & Khurram., 2025). د ساتنې (Retention) تگلاره په پراخه

توگه د يوې يوځای کونکې لارې په توگه پېژندل شوې ده، چې د توليد د موخو او د ژوند بڼو (Biodiversity) او د ايکوسېستم د زغم (Resilience) پایلو تر منځ توازن رامنځته کوي (Gustafsson او همکاران ، 2012، 2020؛ Lindenmayer او همکاران ، 2012).

د مرستې شوې طبيعي بيا ټوکېدنه (Assisted Natural Regeneration – ANR) او د بيا ټوکېدنې د فرصتونو ساتنه: په هغو سيمو کې چې د تخم سرچينې لاهم شتون لري، د ANR تگلاره د څر، د څارويو د خوراک، او د تکراري پرېکولو د مخنيوي له لارې د طبيعي نيالگيو ساتنه او ازادې تضمینوي، چې دا يوه ارزانه او اغېزمنه لاره ده د ځوانو ونو د نويو ډلو د بيا جوړولو لپاره. د FAO او GEF گډو نوښتونو په باغيښ، هرات او نوردې ولايتونو کې د تخم شونو يا کينول شويو ساحو احاطه، د څر پر نوبت بدل بنسټ يا د کنټرول لاندې څر، او د سيمه ييزې پوهاوي پروگرامونه يوځای کړي دي. د لومړنيو پایلو له مخې، نږدې ۱۷۰۰ هکتاره د شيندار پسته يي ځنگلونو د بياځنگلولو او نوې ځنگل جوړونې پروسه ترسره شوې ده، او د څر نوبتي نظامونه بياوړي شوي چې د ځوانو ونو پر ډلو فشار راکموي (FAO-GEF، ۲۰۲۴). دا اقدامات په مستقيم ډول د افغانستان د وچو ځنگلونو د بياوړې له ستونزو سره مقابله کوي.

په لوي منظر کې د ځنگلونو او څرځايونو گډ پلان جوړول:

په افغانستان کې د ډېرو کليوالو سيمو په کچه، د ځنگل ټوټې له ډېره کارېدونکو څرځايونو سره محدوديت لري. متناوب څر (دوراني څرول)، موسمي بنديز لرونکي ساحې (Ex closers)، او د اکولوژيکو دهلېزونو ساتنه د نوې ونې د نيالگيو خوړل کموي او زمينه برابروي چې د بيا ټوکېدنې بهر له نيالگي څخه د ځوانې ونې يا نوي نيالگي (سپلينگ) مرحلې ته ورسېږي، د FAO پروگرامونه راپور ورکوي چې لسگونه زره هکتاره سيمه د دوراني څرولو لپاره په موسمي ډول وېشل کېږي. دا لاره چاره کولای شي د پيستي د ځنگلونو په کمربندونو او د سرو بلوط/صنوبر (juniper) په لمنو کې د ځنگل د بيارغونې د موخو سره همغږې شي (Iqbal & Khurram., 2025).

د جوړښتي شاخصونو پر بنسټ څارنه او د تطبيقي مديريت پلي کول:

د جوړښتي نښو نښانو منظم تعقيب، لکه د قطر د طبقه بندي وېش، عمودي طبقوي شاخصونه، د پاڼو پوښښ توپير، د پاتې شونو زړو ونو کثافت، او د پرېوتو وچو لرگيو (CWD) حجم؛ د بيارغونې د ناکامۍ په اړه مخکنی خبرداری برابروي او د سلويکلچري تگلارو د سمون او اصلاح لارښوونه کوي (Iqbal & Khurram., 2025). په افغانستان کې د کليوالو سيمو په ډېرو برخو کې د ځنگلونو ټوټې د ډېر کارېدونکو څرځايونو سره نښتي دي. د څر ځايونو بدلېدل، موسمي بنديزونه، او د لارې محافظت د بوټو د تخمونو د خوړلو مخه نيسي او د بوټو د ودې لپاره د مناسبو شرايطو په برابرولو کې مرسته کوي؛ ترڅو د بوټو د ودې پروسه بشپړه شي.

د تگلارو او عملي کړنو پایلې / اغېزې

د ساتنې پر بنسټ ځنگل پالنه:

د زړو او تخم لرونکو ونو او همدارنگه د پرېوتو وچو لرگيو (CWD) د ساتنې اصول بايد رسمي او کوډ شي. همدارنگه په جلعوزه کې د مخروطي برخې حاصلاتو مقررات بايد رسمي شي، څو تخم له زيانه وژغورل شي او د ونو د نسلونو پرلپسې تسلسل تأمين شي (Gustafsson et al., 2012, 2020; Lindenmayer et al., 2012; Khurram et al., 2023).

مرستندويه طبيعي بيا ټوکېدنه (ANR) او د بيا ټوکېدنې د ساتنې فرصتونه:

په هغه سيمو کې چې د بيا رغاونې فعاليتونه ډېر دي، د موسمي تړل شويو ساحو او دوراني څرولو سيستمونه د توافق له مخې وکاروئ؛ هغه دهلېزونو ته لومړيتوب ورکړل شي، چې څاروي له د بيا رغاونې ساحو ليرې وساتي (FAO، 2019).

د سلويکلچري کړنو له لارې د جوړښت پېچلتيا:

د بې عمره جوړښتونو ملاتړ کول، د وچکالی پر وړاندې مقاومت لرونکو گډو نوعو (مخلوط) په گډون غني کول، د ونو د تاجونو نری کول چې عمودي ناهمواري بېرته رامنځته کوي، او په قصدي توگه د وچو لرگيو جوړول؛ د پاتې شونو د ساتنې لپاره د ژغورنې (salvage) شدت محدود کول (Messier et al., 2013; Mori et al., 2013).

د ټولني پر بنسټ د ځنگل مدیریت (CBFM) او د غیر لرگیو ځنگلي محصولاتو مدیریت :

د ټولني د قواعدو او د گټو د وېش میکانیزمونه له REDD+/FREL تادیاتو سره ونښلول شي، خو د تخریب د مخنیوي او د دایمي لرگیو د جوړښت د پیچلتیا (SSC) پر بنسټ د بیا رغونې پروگرامونه تمویل کړي. دا بهیر باید د شفافې څارنې له لارې پر مخ ولاړ شي (Khurram et al., 2024; Teimoory et al., 2022).

د پایدار مدیریت لپاره راتلونکي لوري

- **خو-سطحي مدیریت:** اوسني د مدیریت نظرونه او ټکنالوژي، چې ډېري يې د ځنگل د قطعې يا د باد ماتونکي پټو په کچه رامنځته شوي، باید د ایکوسیستم د اصولو پر بنسټ د منظرو (Landscape) او سیمه ییزو کچو ته پراخ شي (Zhu and Zheng, 2019).
- **هراړخیزه ارزونه:** د لویو کچو په سطحه د ځنگل ایکولوژیکي انجنیرۍ هراړخیزه ارزونه ضروري ده، ترڅو اکولوژیکي اغېزې وپېژندل شي او د مدیریت لارښود برابر کړي (Brang et al. 2006; Zagas et al. 2011). ځکه چې دا نظریې او ټکنالوژي سره نښلوي، یعنې ارزونه د دې لپاره مهمه ده چې د ساینسي مدیریت کړنې تایید شي او ساتندوی ځنگلونه خپل هدف ترلاسه کړي. برسېره پر دې، ارزونه کولی شي هغه اکولوژیکي میکانیزمونه تشریح کړي چې د ساتندوی ځنگلونو د فعالیت اساس جوړوي. په بدل کې، د ارزونې پایلې د مدیریت د ښه والي یا لارښود لپاره کارول کېدای شي (Brang et al., 2006).
- **د اقلیم د بدلون سره تطابق:** څېړنې ته اړتیا ده چې وڅېړل شي څرنگه د اقلیم بدلون د ساتندوی ځنگلونو پر فعالیت اغېزه کوي او د دې لپاره تطابق لرونکي ستراتیژي څنگه جوړېدای شي ترڅو د هغوی اوږدمهاله اغېزمنتیا او پایداری وساتل شي (Zhu & Zheng, 2019).

د څېړنې تشي:

- ❖ د اقلیم بدلون لاندې د ونو د ودې اوږدمهاله ماډلونه لا هم بشپړ نه او کم دي (Gustafsson et al., 2020).
- ❖ په افغانستان کې د سلویکلچر ځانگړي سیستمونه او ماډلونه پوره تطبیق شوي نه دي (Knoke et al., 2020).
- ❖ اقتصادي تحلیل د ټولني پر بنسټ مدیریت کې کم دی، لکه د ونو د محصولاتو او عوایدو پایداری مطالعه؛
- ❖ د آفتونو، اور، او ناروغیو د مخنیوي لپاره مناسب سلویکلچري میتودونه لا په بشپړ ډول څېړل شوي نه دي (Díaz-Yáñez et al., 2019).

پایلي

د سلویکلچري تگلارو او کړنو علمي بیاکتني څرگنده کړه، چې د دوامدارو ځنگلونو مدیریت د افغانستان په شرایطو کې ستر اهمیت لري، په ځانگړي ډول هغه سیمې چې د اقلیمي بدلون، بې رویه کارونې، ناقانونه پرېکولو او د ټولنیزو اقتصادي فشارونو لاندې دي. څېړنو وښوده چې مناسبې سلویکلچري تگلارې، لکه د ځنگل د ودې تنظیم، د ډولونو ترکیب مدیریت، د ځنگلي ځمکو بیارغونه، د ځوانو ونو ساتنه، او د پراخې ټولني گډون، د اکولوژیکي پایداری، د ځنگلي سرچینو د ښې او جوړښت ثبات، او د ځنگلي خدماتو د دوام لپاره اساسي رول لري.

نړیوالې څېړنې هم دا تاییدوي چې فعاله سلویکلچري کړنې د ځنگلونو مقاومت، تنوع، د اور خطر کمول، د اقلیم بدلون پر وړاندې تطبیق، او د کاربن ذخیرې زیاتوالی تضمینوي. په افغانستان کې د دغو تگلارو پلي کول کولی شي د ځنگلونو د بیا ټوکېدنې پروسه گړندی کړي، د خلکو لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي، او د طبیعي ایکوسیستمونو ساتنه پیاوړې کړي.

په ټوله کې، پایلې ښيي چې د سلویکلچري عملیاتو پر بنسټ منظم، علمي او ټولنیز مشارکتی مدیریت نه یوازې د موجوده ځنگلونو د ساتنې لپاره مهم دی، بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره د پایداری او سالمو ځنگلي ایکوسیستمونو د جوړېدو بنسټ هم برابروي. راتلونکي څېړنې به د افغانستان په طبیعي ځنگلونو کې د بیلابیلو سلویکلچري تگلارو د مقایسوي ارزونه وي، چې له جملې به یې هغه تگلارو باندې بحث وشي چې ورته اړتیا ده او لا تراوسه د افغانستان په شرایطو کې نه دي په کار اچول شوي.

اخځليکونه

- امین، دوست محمد (۱۳۹۵). د افغانستان او نړی د ژوند چاپیریالی ننگونې. جلال اباد مومند څېړندویه ټولنه. خرم، صفی الله (۲۰۲۴). په افغانستان کې د جلفوزي راټولول، سمون او ساتنه. <https://esrj.edu.af/esrj/article/view/28>.
- دوستکامی، سمیرا، خسروپور، نیشتمان، میرزایی، جواد (۱۳۹۲). اهمیت و نقش جنگل های زاگرس در توسعه پایدار. کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس. ص ۷-۱.
- رشتین، ص. او صافی، ع. (۱۴۰۳). د اوبو مدیریت او کاری فرصتونه. د کابل پوهنتون د طبیعي علومو علمي-څېړنيزه مجله، ۷(۴)، ۷۱-۸۷. <http://doi.org/10.62810/jns.v7i4.75>
- رضای، پگاه (۱۳۹۰). نقش جنگل‌ها و مراتع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زیست محیطی و اثرات مخرب جاده های جنگلی بر جنگل‌ها. همایش منطقه ای جنگل‌ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار.
- گلاب شاه امانی (۲۰۲۵). واکاوی شرایط و زمینه‌های مدیریت مطلوب منابع طبیعی افغانستان برای توسعه پایدار. *Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.62810/jss.v8i2.378>
- Aerts, R., & Honnay, O. (2011). Forest restoration, biodiversity and ecosystem functioning. *BMC ecology*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.1186/1472-6785-11-29>.
- Altieri, V., De Franco, S., Lombardi, F., Marziliano, P. A., Menguzzato, G., & Porto, P. (2018). The role of silvicultural systems and forest types in preventing soil erosion processes in mountain forests: a methodological approach using cesium-137 measurements. *Journal of Soils and Sediments*, 18(12), 3378-3387. <https://doi.org/10.1007/s11368-018-1957-8>.
- Ameray, A., Bergeron, Y., Valeria, O., Montoro Girona, M., & Cavard, X. (2021). Forest carbon management: A review of silvicultural practices and management strategies across boreal, temperate and tropical forests. *Current Forestry Reports*, 7(4), 245-266. <https://doi.org/10.1007/s40725-021-00151-w>.
- Bond, W. J., & Midgley, J. J. (2001). Ecology of sprouting in woody plants: the persistence niche. *Trends in ecology & evolution*, 16(1), 45-51. [https://doi.org/10.1016/S0169-5347\(00\)02033-4](https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)02033-4).
- Bond, W. J., & Midgley, J. J. (2003). The evolutionary ecology of sprouting in woody plants. *International Journal of Plant Sciences*, 164(S3), S103-S114. <https://doi.org/10.1086/374191>.
- Boyle, J. R., Tappeiner II, J. C., Waring, R. H., & Smith, C. T. (2016). Sustainable forestry: Ecology and silviculture for resilient forests. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09761-X>.
- Brang, P., Schönenberger, W., Frehner, M., Schwitter, R., Thormann, J. J., & Wasser, B. (2006). Management of protection forests in the European Alps: an overview.
- D'Amato, A. W., & Palik, B. J. (2021). Building on the last "new" thing: exploring the compatibility of ecological and adaptation silviculture. *Canadian Journal of Forest Research*, 51(2), 172-180. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0306>.
- Bazarov, D., Ahmadi, M., Ghayur, A., & Vokhidov, O. (2023). The Kabul River Basin-the source of the Naglu and other reservoirs. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 03047). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336503047>.
- Decocq, G., Aubert, M., Dupont, F., Alard, D., Saguez, R., WATTEZ-FRANGER, A. N. N. I. E., ... & Bardat, J. (2004). Plant diversity in a managed temperate deciduous forest: understorey response to two silvicultural systems. *Journal of Applied Ecology*, 41(6), 1065-1079. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8901.2004.00960.x>.
- Díaz-Yáñez, O., Pukkala, T., Packalen, P., & Peltola, H. (2020). Multifunctional comparison of different management strategies in boreal forests. *Forestry: An International Journal of Forest Research*, 93(1), 84-95. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpz053>.
- Dye, A. W., Houtman, R. M., Gao, P., Anderegg, W. R., Fettig, C. J., Hicke, J. A., ... & Riley, K. L. (2024). Carbon, climate, and natural disturbance: a review of mechanisms, challenges, and tools for understanding forest carbon stability in an uncertain future. *Carbon Balance and Management*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s13021-024-00282-0>
- Egbonyi, D. E., Ayah, G. B., & Ozoh, S. I. (2019). environmental awareness strategies, social media and sustainable utilization of forest resources among farmers in cross river state, Nigeria.
- FAO, 2024. The State of the World's Forests 2024. FAO. <https://www.fao.org/4/i3129e/i3129e>.
- Formoli, T. A. (1995). Impacts of the Afghan-Soviet war on Afghanistan's environment. *Environmental Conservation*, 22(1), 66-69.
- Fatichi, S., Leuzinger, S., & Körner, C. (2014). Moving beyond photosynthesis: From carbon source to sink-driven vegetation modeling. *The New Phytologist*, 201, 1086-1095. <https://doi.org/10.1017/S0376892900034093>.
- Garbarino, M., Morresi, D., Urbinati, C., Malandra, F., Motta, R., Sibona, E. M., ... & Weisberg, P. J. (2020). Contrasting land use legacy effects on forest landscape dynamics in the Italian Alps and the Apennines. *Landscape Ecology*, 35(12), 2679-2694.
- Garfi, V., Marziliano, P., Chirici, G., Nicolaci, A., & Iovino, F. (2022). Forest management scenarios to reduce the fire risk in chestnut coppices in the Mediterranean area. *Annals of Silvicultural Research*, 47. <https://doi.org/10.1007/s10980-020-01013-9>.
- Grassi, G., House, J., Dentener, F., Federici, S., Den Elzen, M., & Penman, J. (2017). The key role of forests in meeting climate targets requires science for credible mitigation. *Nature Climate Change*, 7(3), 220-226. <https://doi.org/10.1038/nclimate3227>.

- Gustafsson, L., Baker, S. C., Bauhus, J., Beese, W. J., Brodie, A., Kouki, J., ... & Franklin, J. F. (2012). Retention forestry to maintain multifunctional forests: a world perspective. *BioScience*, 62(7), 633-645. <https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.7.6> .
- Gustafsson, L., Fedrowitz, K., & Hazel, M. N. (2020). Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-cover forestry. *Ambio*, 49, 85–97. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01190-1> .
- Gustafson, E. J., Kern, C. C., Miranda, B. R., Sturtevant, B. R., Bronson, D. R., & Kabrick, J. M. (2020). Climate adaptive silviculture strategies: How do they impact growth, yield, diversity and value in forested landscapes? *Forest ecology and management*, 470, 118208. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118208> .
- Harris, N. L., Gibbs, D. A., Baccini, A., Birdsey, R. A., De Bruin, S., Farina, M., ... & Tyukavina, A. (2021). Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes. *Nature Climate Change*, 11(3), 234-240. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-00976-6> .
- Miller, G. W., & Kochenderfer, J. N. (1998). Maintaining Species Diversity in the Central Appalachians. *Journal of Forests*. <https://doi.org/10.1093/jof/96.7.28> .
- Najmuddin, O., Li, Z., Khan, R., & Zhuang, W. (2022). Valuation of land-use/land-cover-based ecosystem services in Afghanistan—an assessment of the past and future. *Land*, 11(11), 1906.
- Hessburg, P. F., Prichard, S. J., Hagmann, R. K., Povak, N. A., & Lake, F. K. (2021). Wildfire and climate change adaptation of western North American forests: a case for intentional management. *Ecological applications*, 31(8), e02432. <https://doi.org/10.1002/eap.2432> .
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report, Summary for Policymakers*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee & J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001> .
- Iqbal, Javidullah, and Khurram Safiullah. "Human Impacts on Forest Stand Structure and Ecosystem Resilience: A Focus on Afghanistan." *ESRJ* 63, no. 2 (2025): 74-83. <https://esrj.edu.af/esrj/article/view/53> .
- Kamp, J. (2022). Coppice loss and persistence in Germany. *Trees, Forests and People*, 8, 100227. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100227> .
- Khurram, S., & Shalizi, M. N. (2016). Traditional and alternative techniques of Chilgoza Pine (*Pinus gerardiana* Wall. ex D. Don) nut harvesting and processing in Afghanistan. *International Journal of Bioassays*, 5(11), 5011–5015. <https://doi.org/10.21746/ijbio.2016.11.004>.
- Khurram, S., Larawai, M. I., Shalizi, M. N., Akamani, K., & Groninger, J. W. (2023). Assessing regeneration strategies for sustaining intensively used chilgoza pine-dominated community forests in Afghanistan. *Trees, Forests and People*, 14, 100443. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100443>.
- Khurram, S., Shalizi, M. N., Bashari, M., Akamani, K., & Groninger, J. W. (2024). Barriers and opportunities regarding community-based forest management in Afghanistan: Considerations for fragile states. *Environmental Conservation*, 51(1), 6–16. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100443>.
- Koop, H. (1987). Vegetative reproduction of trees in some European natural forests. *Vegetatio*, 72(2), 103-110. <https://doi.org/10.1007/BF00044840> .
- Knoke, T., Kindu, M., Jarisch, I., Gosling, E., Friedrich, S., Bödeker, K., & Paul, C. (2020). How considering multiple criteria, uncertainty scenarios and biological interactions may influence the optimal silvicultural strategy for a mixed forest. *Forest Policy and Economics*, 118, 102239. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102239> .
- Latterini, F., Mederski, P. S., Jaeger, D., Venanzi, R., Tavankar, F., & Picchio, R. (2023). The influence of various silvicultural treatments and forest operations on tree species biodiversity. *Current Forestry Reports*, 9(2), 59-71. <https://doi.org/10.1007/s40725-023-00179-0> .
- Leite, B. (2024). Forest management in the era of urbanization and deforestation. *Journal of Biodiversities Management & Forestry*, 13(4).
- Lindenmayer, D. B., Franklin, J. F., & Fischer, J. (2012). A major shift to the retention approach for forestry can help resolve some global forest sustainability issues. *Conservation Letters*, 5(6), 421–431. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00257.x> .
- Mahmoodi, M. B., Shalizi, M. N., Groninger, J. W., Akamani, K., & Khurram, S. (2023). Stand characteristics and perceptions of local communities on the management of pistachio (*Pistacia vera* L.) forests in an unstable region of Afghanistan. *Journal of Sustainable Forestry*, 42(2), 170-188. <https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1978097> .
- Matula, R., Šrámek, M., Kvasnica, J., Uherková, B., Slepíčka, J., Matoušková, M., Kutchartt, E., & Svátek, M. (2019). Pre-disturbance tree size, sprouting vigour and competition drive the survival and growth of resprouting trees. *Forest Ecology and Management*, 446, 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.012> .
- Matula, R., Svátek, M., Kůrová, J., Úradníček, L., Kadavý, J., & Kneifl, M. (2012). The sprouting ability of the main tree species in Central European coppices: implications for coppice restoration. *European Journal of Forest Research*, 131(5), 1501-1511. <https://doi.org/10.1007/s10342-012-0618-5> .
- McGrath, M. J., Luyssaert, S., Meyfroidt, P., Kaplan, J. O., Bürgi, M., Chen, Y., ... & Valade, A. (2015). Reconstructing European Forest management from 1600 to 2010. *Biogeosciences*, 12(14), 4291-4316. <https://doi.org/10.5194/bg-12-4291-2015> .

- Messier, C., Puettmann, K. J., & Coates, K. D. (Eds.). (2013). *Managing forests as complex adaptive systems: building resilience to the challenge of global change*. Routledge.
- Miura, S., Amacher, M., Hofer, T., San-Miguel-Ayanz, J., & Thackway, R. (2015). Protective functions and ecosystem services of global forests in the past quarter-century. *Forest Ecology and Management*, 352, 35-46. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.03.039> .
- Miller, G. W., & Kochenderfer, J. N. (1998). Maintaining species diversity in the central Appalachians. *Journal of Forestry*, 96(7), 28-33. <https://doi.org/10.1093/jof/96.7.28> .
- Mori, A. S., Furukawa, T., & Sasaki, T. (2013). Response diversity determines the resilience of ecosystems to environmental change. *Biological reviews*, 88(2), 349-364. <https://doi.org/10.1111/brv.12004> .
- Nura, K. T., & Endris, F. S. (2020). Assessment of levels of community awareness to effects of forest degradation and their environmental management practices in Jimma Zone, South Western Ethiopia. *Int. J. Multicult. Multireligious Underst*, 7(2), 212.
- Prins, K. (2022). War in Ukraine, and extensive forest damage in central Europe: Supplementary challenges for forests and timber or the beginning of a new era? *Forest Policy and Economics*, 140, 102736. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102736> .
- Pujo, P., Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2), 113-126. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3> .
- Santorio, A., & Piras, F. (2023). Natural forests or cultural forests? Forest changes within Italian protected areas in the last 85 years. *Forests*, 14(5), 921. <https://doi.org/10.3390/f14050921> .
- Schirpke, U., Tasser, E., Borsky, S., Braun, M., Eitzinger, J., Gaube, V., Getzner, M., Glatzel, S., Gschwantner, T., Kirchner, M., Leitinger, G., Mehdi-Schulz, B., Mitter, H., Scheifinger, H., Thaler, S., Thom, D., & Thaler, T. (2023). Past and future impacts of land-use changes on ecosystem services in Austria. *Journal of Environmental Management*, 345, 118728. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118728> .
- Shalizi, M. N., Khurram, S., Groninger, J. W., Ruffner, C. M., & Burney, O. T. (2018). Indigenous knowledge and stand characteristics of a threatened tree species in a highly insecure area: Chilgoza pine in Afghanistan. *Forest Ecology and Management*, 413, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.01.053> .
- Sidle, R. C., & Ziegler, A. D. (2017). The canopy interception-landslide initiation conundrum: insight from a tropical secondary forest in northern Thailand. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(1), 651-667. <https://doi.org/10.5194/hess-21-651-2017> .
- Szabó, P. (2009). Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection? *Forest ecology and management*, 257(12), 2327-2330. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.03.035> .
- Teimoory, N., Sasaki, N., & Abe, I. (2022). Estimation of baseline emissions, forest reference emission level, and carbon removals due to forest area changes in Afghanistan between 1993 and 2030. *Cleaner Production Letters*, 2, 100003. <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100003> .
- Thomas, S. C., Halpern, C. B., Falk, D. A., Liguori, D. A., & Austin, K. A. (1999). Plant diversity in managed forests: understory responses to thinning and fertilization. *Ecological applications*, 9(3), 864-879. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(1999\)009\[0864:PDIMFU\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(1999)009[0864:PDIMFU]2.0.CO;2) .
- Vacchiano, G., Berretti, R., Brenta, P., Meloni, F., Motta, R., Nosenzo, A., & Terzuolo, P. G. (2017). Vegetative regeneration of beech coppices for biomass in Piedmont, NW Italy. *Biomass and Bioenergy*, 107, 271-278. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.10.018> .
- Vecchio, D., Bono, A., Resente, G., Musio, L., Berretti, R., Ascoli, D., ... & Motta, R. (2025). The effects of cutting season on stump mortality and resprouting in southern European Sweet chestnut (*Castanea sativa* Mill.) coppices. *Forest Ecology and Management*, 585, 122610. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.122610> .
- Walker, A. P., De Kauwe, M. G., Bastos, A., Belmecheri, S., Georgiou, K., Keeling, R. F., ... & Zuidema, P. A. (2021). Integrating the evidence for a terrestrial carbon sink caused by increasing atmospheric CO₂. *New phytologist*, 229(5), 2413-2445. <https://doi.org/10.1111/nph.16866> .
- Yousefpour, R., Jacobsen, J. B., Thorsen, B. J., Meilby, H., Hanewinkel, M., & Oehler, K. (2012). A review of decision-making approaches to handle uncertainty and risk in adaptive forest management under climate change. *Annals of forest science*, 69(1), 1-15. <https://doi.org/10.1007/s13595-011-0153-4> .
- Zagas, T. D., Raptis, D. I., & Zagas, D. T. (2011). Identifying and mapping the protective forests of southeast Mt. Olympus as a tool for sustainable ecological and silvicultural planning, in a multi-purpose forest management framework. *Ecological Engineering*, 37(2), 286-293. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.11.004> .
- ZHU, J. J., & ZHENG, X. (2019). The prospects of development of the Three-North Afforestation Program (TNAP): On the basis of the results of the 40-year construction general assessment of the TNAP. *Chinese Journal of Ecology*, 38(5), 1600.
- Zore, A., Bezak, N., & Šraj, M. (2022). The influence of rainfall interception on the erosive power of raindrops under the birch tree. *Journal of hydrology*, 613, 128478. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128478> .
- 藤森, 隆郎. (2001). *Ecological and silvicultural strategies for sustainable forest management*. Elsevier, BA54018819, 0444505342 1971430859752917167.